Respuesta de los CDC al **zika**

Directrices provisionales:

Mujeres embarazadas que viven en un área de transmisión actual del virus del Zika

Mujer embarazada que vive en un área de transmisión actual del virus del Zika (http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices)

Mujer embarazada que presenta cuadro clínico consistente con la enfermedad por el virus del Zika [1]

Prueba para la infección por el virus del Zika

- Considerar la posibilidad de realizar ultrasonidos fetales seriados Considerar la posibilidad de realizar la amniocentesis para la prueba del virus del Zika
  - Considerar la posibilidad de realizar ultrasonidos fetales seriados
  - Considerar la posibilidad de realizar la amniocentesis para la prueba del virus del Zika
- Prueba(s) negativa(s) para la infección por el virus del Zika
  - Ultrasonido fetal para detectar microcefalia o calcificaciones intracraneales
    - Presencia de microcefalia o calcificaciones intracraneales
      - Volver a hacer la prueba para la infección por el virus del Zika a la mujer embarazada
      - Considerar la posibilidad de realizar la amniocentesis para la prueba del virus del Zika
    - No hay presencia de microcefalia ni calcificaciones intracraneales
      - Cuidado prenatal de rutina
      - Prueba para la infección por el virus del Zika a mediados del 2.º trimestre
      - Considerar la posibilidad de realizar un ultrasonido fetal adicional

Mujer embarazada que no presenta cuadro clínico consistente con la enfermedad por el virus del Zika [1]

Prueba para la infección por el virus del Zika al inicio de la atención prenatal [2]

- Prueba positiva o no concluyente para la Infección por el virus del Zika
  - Considerar la posibilidad de realizar ultrasonidos fetales seriados
  - Considerar la posibilidad de realizar la amniocentesis para la prueba del virus del Zika
- Prueba(s) negativa(s) para la infección por el virus del Zika
  - Ultrasonido fetal a las 18-20 semanas de gestación
  - Prueba para la infección por el virus del Zika a mediados del 2.º trimestre
    - Microcefalia o calcificaciones intracraneales del feto o
    - Prueba positiva o no concluyente para la infección por el virus del Zika
      - Considerar la posibilidad de realizar ultrasonidos fetales seriados
      - Considerar la posibilidad de realizar la amniocentesis para la prueba del virus del Zika
    - No existe microcefalia ni calcificaciones intracraneales
    - Prueba negativa para el virus del Zika
      - Cuidado prenatal de rutina
      - Considerar la posibilidad de realizar un ultrasonido adicional
      - Microcefalia o calcificaciones intracraneales del feto
      - Considerar la posibilidad de volver a hacer la prueba para la infección por el virus del Zika y la amniocentesis

[1] El cuadro clínico consistente con la enfermedad por el virus del Zika incluye dos o más de los siguientes signos o síntomas: aparición repentina de fiebre, sarpullido máculo-papular, artralgia o conjuntivitis.

[2] Los funcionarios de salud locales deben determinar el momento de implementar las pruebas a las mujeres embarazadas asintomáticas, teniendo en cuenta la información acerca de los niveles de transmisión del virus del Zika y la capacidad de laboratorio.

Las directrices provisionales actualizadas y otros recursos para los proveedores de atención médica están disponibles en http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/index.html

espanol.cdc.gov/zika

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
Centros para el Control y Prevención De Enfermedades