


Respuesta al zika 2016: Algoritmo para la realización de pruebas de detección en personas sintomáticas en los EE. UU.*

Especímenes tomados ≥ 14 días después de la aparición de los síntomas



NOTA: Informar los resultados de todas las pruebas a las autoridades de salud correspondientes. Los resultados se deben analizar en el contexto de los síntomas, el riesgo de exposición y el momento de recolección del espécimen.

*Personas sintomáticas, embarazadas y no embarazadas

**Tenga en cuenta que la reactividad cruzada de los anticuerpos a otros flavivirus complica la interpretación de las actuales pruebas IgM para zika. La prueba IgM para el dengue se debe realizar en mujeres embarazadas sintomáticas, individuos con una posible exposición al dengue y cuando se obtenga un resultado presunto de otro flavivirus. Consulte el texto en las páginas 3-5, para obtener más información.

***Tenga en cuenta que si las pruebas de IgM para zika y dengue no son reactivas, debe realizarse la prueba de IgM contra el chikunguña en personas con riesgo de exposición al chikunguña y una enfermedad clínicamente compatible.

†Actualmente, la confirmación de la PRNT no se recomienda como rutina para Puerto Rico. Consulte la página 5 para más información.

Idioma inglés, versión accesible: <http://www.cdc.gov/zika/pdfs/algorithm-for-us-testing-of-symptomatic-individuals-chart-2.pdf>