


Respuesta al zika 2016: Algoritmo de pruebas de detección en personas sintomáticas en los EE. UU.*
Especímenes tomados <14 días después de la aparición de los síntomas



NOTA: Informar los resultados de todas las pruebas. Los resultados se deben analizar en el contexto de los síntomas, el riesgo de exposición y el momento de recolección del espécimen.

*Personas sintomáticas, embarazadas y no embarazadas

**Tenga en cuenta que la reactividad cruzada de los anticuerpos a otros flavivirus complica la interpretación de las actuales pruebas IgM para zika. La prueba IgM para el dengue se debe realizar en mujeres embarazadas sintomáticas, individuos con una posible exposición al dengue y cuando se obtenga un resultado presunto de otro flavivirus. Consulte el texto en las páginas 3-4, para obtener más información.

*** Indica la prueba y la interpretación para la prueba Trioplex de los CDC. Tenga en cuenta que cuando se realiza el análisis de orina y líquido amniótico con la prueba Trioplex de los CDC, solo se reporta el resultado para zika.

*Actualmente, la confirmación de la PRNT no se recomienda como rutina para Puerto Rico. Consulte la página 5 para más información.

Idioma inglés, versión accesible: <http://www.cdc.gov/zika/pdfs/algorithm-for-us-testing-of-symptomatic-individuals.pdf>