

Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)




Lo que los padres **NECESITAN SABER**

El MIS-C es una complicación rara, pero grave, asociada al COVID-19. Se presenta en niños, adolescentes y adultos jóvenes, cuyas partes del cuerpo pueden inflamarse.



1. Reconozca los signos y síntomas

Esté atento a los síntomas de MIS-C, especialmente si su hijo tuvo COVID-19 o ha estado en contacto cercano con alguien que tenía COVID-19 en las últimas 6 semanas.



2. Busque atención médica

Aunque no esté seguro de que su hijo tuvo COVID-19, llame al médico de inmediato si su hijo está mostrando signos y síntomas de MIS-C.



3. Trabaje con su equipo de atención médica

Si se sospecha la presencia de MIS-C, los proveedores de atención médica harán pruebas para detectar signos de la afección. Estas pueden incluir:

- Análisis de sangre
- Radiografía de tórax
- Ecografía del corazón (ecocardiograma)
- Ecografía del abdomen

SÍNTOMAS DE POSIBLE MIS-C

Fiebre continua Y más de uno de los siguientes síntomas:



- Dolor abdominal
- Mareos y sensación de desmayo
- Vómitos
- Sarpullido
- Diarrea
- Ojos enrojecidos

Vaya a la sala de emergencia del hospital más cercana si su hijo muestra algún signo grave de advertencia de MIS-C, como los siguientes:

Dificultad para respirar | Dolor o presión en el pecho que no desaparece |
Confusión o comportamiento inusual | Dolor abdominal intenso |
No poder despertarse o permanecer despierto | Color pálido, gris o azulado de la piel,
los labios, o el lecho de las uñas, dependiendo del tono de piel.



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Immunization and Respiratory Diseases

Para obtener más información
<https://espanol.cdc.gov/mis/mis-c.html>

